

tetesept:

Sodbrennen Akut Kautabletten

Gebrauchsinformation, aufmerksam lesen!

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

1 Kautablette enthält: 500 mg Calciumcarbonat, 250 mg Magnesiumoxid.

Sonstige Bestandteile:

Sorbitol, Maisstärke, Pfefferminzöl, Magnesiumstearat, Gummi arabicum.

Darreichungsform und Inhalt:

20 Kautabletten

Hinweis für Diabetiker:

1 Kautablette enthält 0,84 g Sorbitol, entsprechend ca. 0,07 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Sonstige Hinweise:

Kein Gewöhnungseffekt. Auch für Schwangere und Stillende geeignet. Frei von Laktose. Ohne künstliche Farbstoffe. Mit Mینگeschmack.

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung: Sodbrennen Akut Kautabletten neutralisieren schnell und langanhaltend überschüssige Magensäure.

Anwendungsgebiete:

Bei Sodbrennen, saurem Aufstossen, säurebedingten Magenbeschwerden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten?

Veränderungen im Säuregehalt des Magens können die Aufnahme anderer Arzneimittel beeinflussen. Desweiteren können Calcium und Magnesium mit anderen Arzneistoffen Komplexe bilden und so deren Resorption verringern. Generell sollte die Einnahme von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten in einem zeitlichen Abstand von 2 Stunden zu anderen Arzneimitteln erfolgen. Auf diesen zeitlichen Abstand ist besonders bei der Einnahme von Antibiotika, Chinolonen, Betablockern (Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen) und zur Vorbeugung einer zweiten Herzattacke bei vorangegangener erster Herzattacke), ACE-Hemmern (Arzneimittel zur Behandlung von hohem Blutdruck und Herzinsuffizienz), herzwirksamen Glykosiden (Arzneimittel zur Behandlung von angeborener Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen), H₂-Blockern (Arzneimittel zur Behandlung von Verdauungsstörungen, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren und Sodbrennen), Eisen und Eisenverbindungen, nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAIDs; Schmerzmittel wie bspw. Ibuprofen, Aspirin und Naproxen), Ketoconazol (antifungales und antimykotisches Arzneimittel), Antikollitika, Cortico-steroiden oder Phosphaten und Diphosphonaten (Arzneimittel gegen Osteoporose) zu achten.

Weiterhin sollte die gleichzeitige Einnahme mit Thiazid-Diuretika (Arzneimittel gegen Bluthochdruck) vermieden werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten nicht anwenden?
Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Menthol (enthalten in Pfefferminzöl), oder einem der sonstigen Bestandteile sollte tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten nicht angewendet werden.
tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten dürfen nicht eingenommen werden bei Hypercalciämie, bei Niereninsuffizienz, bei Nephrolithiasis aufgrund von Calcium-haltigen Nierensteinen, bei Hypophosphatämie, bei Hypercalciurie.
Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren.

Was müssen Sie vor der Anwendung von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten beachten?

tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Pfefferminzöl oder einen der sonstigen Bestandteile von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten sind.
tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten enthalten Sorbitol. Bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol. Sorbitol kann eine leicht laxierende Wirkung haben.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten sonst nicht richtig wirken können.

Bei Sodbrennen, saurem Aufstossen und säurebedingten Magenbeschwerden.

Soweit nicht anders vorordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren je nach Bedarf 1-2 Kautabletten als Einzeldosis ein. Bei Bedarf können bis zu 4 x täglich

1-2 Kautabletten eingenommen werden. Die maximale Tagesdosis liegt bei 8 Kautabletten.

Wie und wann sollten Sie tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten einnehmen?

tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten werden vorzugsweise eine Stunde nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Zubettgehen oder auch zwischendurch genommen. Die Kautablette kann gelutscht oder zerkaut werden.
tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten können, falls erforderlich, auch über längere Zeit, jedoch nicht länger als 14 Tage eingenommen werden. Bei länger anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt konsultiert werden.

tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten eignen sich gut zur Behandlung gelegentlichen Sodbrennens und gelegentlicher säurebedingter Magenbeschwerden.

Sollten die Symptome länger als 2 Wochen andauern, sollte ein Arzt zurate gezogen werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten können während der Schwangerschaft und Stillzeit gemäß der Einnahmeempfehlung eingenommen werden. Die empfohlene Höchstdosis und Einnahmedauer sollte nicht überschritten werden.

schwangerschaft Frauen haben ein höheres Risiko an Milch-Alkali-Syndrom zu erkranken und sollten eine calciumreiche Ernährung während der Einnahme von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten vermeiden. Es empfiehlt sich, während der Schwangerschaft den Arzt über die Einnahme jeglicher Selbstmedikation zu informieren.

Warnhinweise:

Achten Sie während der Einnahme von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten auf die Einnahme von zusätzlichen Calcium- oder Magnesiumquellen aus Arzneimitteln (siehe Überdosierung) Milch-Alkali-Syndrom und Hypermagnesiämie), Nahrungsergänzungsmitteln oder Lebensmitteln. Milchprodukte haben einen hohen Calciumgehalt (1 Liter Milch kann bis zu 1200 mg Calcium enthalten). Auf eine calciumreiche Ernährung (Milch, Sahne, Käse, Joghurt) und eine Einnahme von calcium- oder magnesiumhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln sollte während der Einnahme von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten verzichtet werden. Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden Magenbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und einen u.U. zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann. Patienten mit der seltenen hereditären Fructose-Intoleranz sollten tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten nicht einnehmen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten auftreten?

Es können in Einzelfällen Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes: Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall sowie Verstopfung auftreten.

Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol (enthalten in Pfefferminzöl) Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemwegs) ausgelöst werden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Überdosierung und Anwendungsfehler:

Die Wirkstoffe von tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten neutralisieren die Magensäure im Magen auf rein physikalischem Wege.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu viel tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten eingenommen haben?

Insbesondere bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen oder bei Einnahme hoher Dosen über einen längeren Zeitraum kann es zum Calcium-Alkali-Syndrom (Milch-Alkali-Syndrom) oder Hypermagnesiämie kommen. Das Milch-Alkali-Syndrom ist mit einem hohen Kalziumspiegel im Blut (Hyperkalziämie), einer verminderten Nierenfunktion und in Einzelfällen einer Pankreatitis verbunden. Mögliche Symptome sind ein erhöhter Harndrang, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Erbrechen, ungewöhnliche Müdigkeit oder Schwäche. Bei Verdacht auf diese Nebenwirkungen sollte ein Arzt aufgesucht werden. In schweren Fällen sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Bei Verdacht auf Calcium-Alkali-Syndrom oder Hypermagnesiämie sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden. In schweren Fällen sollte unverzüglich ärztliche Hilfe beansprucht werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig tetesept Sodbrennen Akut Kautabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Führen Sie die Einnahme fort wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

In diesen Fällen kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Produktes:

Das Verfallsdatum dieses Medizinproduktes ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Hinweise zur Lagerung:

Trocken und nicht über 25°C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Produktionsbedingt kann es gelegentlich zum Auftreten von schwarzen Flecken kommen.

Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar.

Brûlures d'estomac aiguës Comprimés à croquer

Notice d'utilisation, à lire attentivement!

Dispositif médical

Composition:

1 comprimé à croquer contient: 500 mg de carbonate de calcium, 250 mg d'oxyde de magnésium.

Autres composants:

Sorbitol, amidon de maïs, huile essentielle de menthe, stéarate de magnésium, gomme arabique.

Forme d'administration et contenu:

20 comprimés à croquer

Information à l'attention des diabétiques:

1 comprimé à croquer contient 0,84 g de sorbitol, ce qui correspond à env. 0,07 unité pan (UP). Si vous devez suivre un régime pour diabétique, il convient d'en tenir compte.

Autres remarques:

Aucun effet d'accoutumance. Convient également en cours de grossesse et d'allaitement. Exempt de lactose. Sans colorant artificiel. Goût mentholé.

Utilisation prévue:

tetesept Brûlures d'estomac aiguës neutralisent rapidement et de manière durable l'excès d'acidité gastrique.

Domaines d'application:

En cas de brûlures d'estomac, aigreurs, gênes gastriques liées à une hyperacidité.

Interactions avec d'autres substances:

Quels médicaments influencent l'action des tetesept Brûlures d'estomac aiguës?

Des changements d'acidité de l'estomac peuvent affecter l'absorption d'autres médicaments. En outre, le calcium et le magnésium peuvent former des complexes avec d'autres médicaments, réduisant ainsi leur absorption. En règle générale, la prise de tetesept comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac doit se faire à 2 heures d'écart par rapport aux autres médicaments. Cet intervalle de temps est particulièrement important en cas de prise d'antibiotiques, de quinolones, de bêtabloquants (médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque et pour éviter une deuxième crise cardiaque en cas de première crise cardiaque), d'IEC (médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque), de glycosides cardiotoniques (médicaments utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque congénitale et les troubles du rythme cardiaque), de bloqueurs H₂ (médicaments utilisés pour traiter les troubles digestifs, les ulcères gastriques et duodénaux et les brûlures d'estomac), de fer et de composés du fer, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS; analgésiques comme l'ibuprofène, l'aspirine et le naproxène), de cétocazole (médicament antioxydant et antifongique), d'anti-convulsifs, de corticostéroïdes ou de phosphates et diphosphonates (médicaments contre l'ostéoporose). En outre, il faut éviter la prise simultanée de diurétiques thiazidiques (médicaments contre l'hypertension).

Contre-indications:

Dans quel cas tetesept Brûlures d'estomac aiguës ne peuvent-ils être utilisés?

En cas d'hypersensibilité connue au menthol (contenu dans l'huile essentielle de menthe poivrée) ou à l'un des autres composants, les tetesept comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac ne doivent pas être utilisés.

tetesept Brûlures d'estomac aiguës ne peuvent être pris en cas d'hypercalciémie, d'insuffisance rénale, de néphrolithiasis due à des calculs rénaux calciques, d'hypophosphatémie, d'hypercalciurie.

Ne pas utiliser chez les enfants et les adolescents de moins de 12 ans.

Quelle précaution faut-il prendre avant d'utiliser tetesept Brûlures d'estomac aiguës?

tetesept Brûlures d'estomac aiguës ne peuvent être utilisés en cas d'hypersensibilité (allergie) à l'huile essentielle de menthe ou à l'un des autres composants du médicament. tetesept Brûlures d'estomac aiguës contiennent du sorbitol. En cas d'intolérance à certains sucres, le produit ne peut être pris que sur avis du médecin. La valeur calorique équivaut à 2,6 kcal/g de sorbitol. Le produit peut avoir un léger effet laxatif.

Posologie, mode et durée d'utilisation:

Les doses suivantes s'appliquent sans indication contraire de votre médecin. Veuillez respecter les prescriptions d'utilisation des tetesept Brûlures d'estomac aiguës sous peine de ne pas obtenir l'effet escompté.

En cas de brûlures d'estomac, d'aigreurs et de gênes gastriques liées à un excès d'acidité:

sans indication contraire, les adultes et les adolescents à partir de 12 ans prennent, selon les besoins, 1-2 comprimés à croquer en dose unique. Si nécessaire, vous pouvez prendre 1-2 comprimés à croquer jusqu'à 4 x par jour. La dose journalière maximale est de 8 comprimés à croquer.

Comment et quand tetesept Brûlures d'estomac aiguës doivent-ils être pris?

tetesept Brûlures d'estomac aiguës doivent être pris de préférence une heure après les repas, si nécessaire avant le coucher ou entre les repas. Le comprimé peut être sucé ou mâché.

tetesept Brûlures d'estomac aiguës peuvent, si nécessaire, être pris pendant une plus longue période qu'il exédera toutefois pas 14 jours. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

tetesept Brûlures d'estomac aiguës conviennent bien au traitement d'es brûlures d'estomac occasionnelles et des troubles gastriques occasionnels liés à un excès d'acidité. Si les symptômes persistent pendant plus de 2 semaines, consultez un médecin.

Quelle précaution faut-il prendre en cours de grossesse et d'allaitement?

Les tétés comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac peuvent être pris pendant la grossesse et l'allaitement conformément aux recommandations. La dose quotidienne et la durée de prise recommandées ne doivent pas être dépassées. Les femmes enceintes ont un risque plus élevé de développer le syndrome des buveurs de lait et doivent éviter de suivre un régime riche en calcium pendant la prise des tétés comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac. Pendant la grossesse, il est recommandé d'informer votre médecin de la prise de tout médicament en automédication.

Avvertissements:

Pendant la prise des tétés comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac, veillez à ne pas prendre de sources supplémentaires de calcium ou de magnésium provenant de médicaments (voir surdosage, syndrome des buveurs de lait ou hypermagnésémie), de compléments alimentaires ou d'aliments. Les produits laitiers ont une teneur élevée en calcium (1 litre de lait peut contenir jusqu'à 1200 mg de calcium). Il faut éviter d'avoir une alimentation riche en calcium (lait, crème, fromage, yaourt) et de prendre des compléments alimentaires contenant du calcium ou du magnésium pendant la prise des tétés comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac.

En cas de nouveaux troubles gastriques et/ou de troubles persistants, consultez un médecin afin qu'il puisse identifier la cause des troubles et une éventuelle maladie sous-jacente nécessitant un traitement.

Les patients atteints de problèmes héréditaires rares d'intolérance au fructose ne doivent pas prendre de tétés comprimés à croquer contre les brûlures d'estomac.

Effets indésirables:

Quels effets indésirables peuvent survenir lors de la prise des tétés Brûlures d'estomac aiguës?

Dans de rares cas, des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée et constipation peuvent survenir.

Chez les personnes y étant sensibles, le menthol (contenu dans l'huile essentielle de menthe poivrée) peut provoquer des réactions d'hypersensibilité (y compris des difficultés respiratoires).

Si vous constatez tout effet indésirable, veuillez en faire part à votre médecin ou votre pharmacien.

Surdosage et mauvaise utilisation:

Les principes actifs des tétés Brûlures d'estomac aiguës neutralisent l'acidité gastrique de manière purement physique. Quelle précaution faut-il prendre en cas de prise d'une trop grande quantité de comprimés à croquer Brûlures d'estomac aiguës tetesept?

En particulier chez les patients qui présentent des troubles de la fonction rénale ou qui prennent de fortes doses pendant une période prolongée, un syndrome des buveurs de lait (syndrome de Burnett) ou une hypermagnésémie peuvent survenir. Le syndrome des buveurs de lait est associé à un taux élevé de calcium dans le sang (hypercalcémie), à une diminution de la fonction rénale et, dans certains cas, à une pancréatite. Les symptômes possibles sont une augmentation du besoin d'uriner, des maux de tête, une perte d'appétit, des nausées ou des vomissements, une fatigue inhabituelle ou une sensation de faiblesse. Si vous pensez souffrir de ces effets secondaires, consultez un médecin. Dans les cas graves, il faut immédiatement demander une aide médicale. Si vous pensez avoir un syndrome des buveurs de lait ou une hypermagnésémie, consultez un médecin. Dans les cas graves, il faut immédiatement demander l'aide d'un médecin.

Quelle précaution faut-il prendre en cas de prise d'une trop faible quantité de tétés Brûlures d'estomac aiguës ou en cas d'oubli?

Poursuivre la prise du médicament comme indiqué dans la posologie.

Quelle précaution faut-il prendre en cas d'interruption ou d'arrêt prématuré du traitement?

Les gènes risquent de réapparaitre dans ces cas.

Remarques relatives à la durée de conservation et au stockage du produit:

La date d'expiration du médicament figure sur le carton d'emballage et les bandes de blister. Ne pas utiliser le médicament après la date d'expiration!

Remarques relatives à la conservation:

Conservé au sec et à une température ne dépassant pas 25°C.

Conservé hors de portée des enfants.

Remarque:

En fonction des conditions de production, des tâches noires sont susceptibles d'apparaître sur certains comprimés. Ceci n'est pas dû à un défaut de qualité.

Pirosi acuta

Compresses masticabiles

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso!

Dispositivo medico

Composizione:

1 compressa masticabile contiene: 500 mg di carbonato di calcio, 250 mg di ossido di magnesio.

Eccipienti:

Sorbitolo, amido di mais, olio di menta piperita, stearato di magnesio, gomma arabica.

Forma farmaceutica e contenuto:

20 compresses masticabiles

Indicazione per i diabetici:

1 compressa masticabile contiene 0,84 g di sorbitolo, equivalenti a circa 0,07 unità di pane (UP). Se segue una dieta per diabetici, dovrà fare attenzione a questa informazione.

Ulteriori indicazioni:

Non produce effetti di assefazione. Adatto anche durante la gravidanza e l'allattamento. Senza lattosio. Senza coloranti artificiali. Con fresco aroma di menta.

Uso previsto:

tetesept Pirosi acuta neutralizzano in modo veloce e duraturo gli acidi gastrici in eccesso.

Indicazioni terapeutiche:

in caso di pirosi, eruttazione acida, fastidio allo stomaco causato da acidi.

Interazioni con altri medicinali:

Quali medicinali influenzano l'azione delle tetesept Pirosi acuta?

Eventuali alterazioni dell'acidità gastrica possono influenzare l'assorbimento di altri principi attivi. Inoltre, calcio e magnesio possono formare dei complessi con altri medicinali e quindi ridurre l'assorbimento. In generale si consiglia di assumere tetesept Pirosi acuta masticabili per il bruciore di stomaco a una distanza di 2 ore da altri medicinali. Questo lasso di tempo va osservato, in particolare, in caso di assunzione di antibiotici, chinoloni, betalobocantici (medicamenti per il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco e per la prevenzione di un secondo attacco cardiaco in caso di precedente infarto), ACE-inibitori (medicamenti per il trattamento dell'ipertensione e dell'insufficienza cardiaca), glicosidi cardiologici (medicamenti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congenita e dei disturbi del ritmo cardiaco), ferro e composti di ferro, antinfiammatori non steroidei (FANS), antidiuretici come, ad esempio, bumetanide, aspirina e naprossene, ketoconazolo (medicamenti antifungini e antimicotici), anticonvulsivi, corticosteroidi o fosforati e bifosfonati (medicamenti contro l'osteoporosi). Inoltre, si deve evitare l'assunzione concomitante di diuretici tiazidici (medicamenti contro l'ipertensione).

Controindicazioni:

Quando non si possono assumere tetesept Pirosi acuta?

Non bisogna utilizzare tetesept Pirosi acuta masticabili per il bruciore di stomaco acuto in caso di nota ipersensibilità al mentolo (contenuto nell'olio di menta piperita) o a uno degli altri componenti. Non bisogna assumere tetesept Pirosi acuta se non si possono assumere in caso di ipercalcemia, insufficienza renale, nefrolitiasi per la presenza di calcoli renali di calcio, ipofosfatemia, ipercalcemia. Non somministrare ai bambini e agli adolescenti sotto i 12 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione delle tetesept Pirosi acuta?

Non assumere tetesept Pirosi acuta, se è ipersensibile (allergico) all'olio di menta piperita o a uno degli eccipienti delle tetesept Pirosi acuta. tetesept Pirosi acuta contengono sorbitolo. In caso di ipersensibilità a determinati zuccheri si deve assumere il prodotto solo dopo aver consultato il medico. Il valore calorico del sorbitolo è di 2,6 kcal/g. Il sorbitolo può avere un leggero effetto lassativo.

Posologia, modo e durata della somministrazione:

Le seguenti indicazioni si applicano se il medico di fiducia non ha fornito prescrizioni diverse per tetesept Pirosi acuta. Attenersi alle indicazioni per l'assunzione, poiché le tetesept Pirosi acuta possono non agire correttamente.

In caso di pirosi, eruttazione acida e fastidio allo stomaco causato da acidi:

Se non prescritto diversamente, in base alla necessità adulti e adolescenti dai 12 anni assumono 1-2 compresses masticabili come dose singola. Se necessario, si possono assumere fino a 1-2 compresses masticabili quattro volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 8 compresses masticabili. Come e quando si dovrebbero assumere tetesept Pirosi acuta?

Assumere tetesept Pirosi acuta preferibilmente un'ora dopo i pasti, se necessario anche prima di andare a dormire o di tanto in tanto. La compressa masticabile può essere succhiata o masticata.

tetesept Pirosi acuta possono essere assunte, se necessario, per periodi prolungati, ma non per più di 14 giorni. Se i disturbi persistono è necessario rivolgersi al medico. tetesept Pirosi acuta sono adatte al trattamento di pirosi e occasionale fastidio allo stomaco causato da acidi. Se i sintomi dovessero manifestarsi per più di 2 settimane, consultare un medico.

A cosa bisogna fare attenzione durante la gravidanza o l'allattamento?

tetesept Compresses masticabili per il bruciore di stomaco acuto possono essere assunte durante la gravidanza e l'allattamento secondo l'uso consigliato. Non superare la dose massima e la durata di assunzione consigliate. Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore di sviluppare la sindrome latte-alcali e dovrebbero evitare un'alimentazione ricca di calcio durante l'assunzione di tetesept Compresses masticabili per il bruciore di stomaco acuto. Durante la gravidanza si raccomanda di informare il medico in merito all'assunzione di qualsiasi tipo di automedicazione.

Avvertenze:

Durante l'assunzione di tetesept Compresses masticabili per il bruciore di stomaco acuto prestare attenzione anche all'assunzione di altre fonti di calcio o magnesio da medicinali (vedere sovradosaggio con sindrome latte-alcali e ipermagnesiemia), integratori alimentari o alimenti. I latticini hanno un alto contenuto di calcio (1 litro di latte può contenere fino a 1200 mg di calcio). Evitare un'alimentazione ricca di calcio (latte, panna, formaggio, yogurt) e l'assunzione di integratori alimentari contenenti calcio o magnesio durante l'assunzione di tetesept Compresses masticabili per il bruciore di stomaco acuto.

In caso di disturbi allo stomaco di nuova insorgenza e/o persistenti, rivolgersi a un medico per individuare la causa e un'eventuale patologia di base che necessita di trattamento. I pazienti con rara intolleranza ereditaria al fruttosio non devono assumere tetesept Compresses masticabili per il bruciore di stomaco acuto.

Effetti collaterali:

Quali effetti collaterali possono manifestarsi in caso di assunzione delle tetesept Pirosi acuta?

In casi singoli possono manifestarsi patologie gastroenteriche: fastidio allo stomaco, nausea e vomito, diarrea e stipsi. Nei pazienti già sensibilizzati, il mentolo (contenuto nell'olio di menta piperita) può scatenare reazioni di ipersensibilità (compresa insufficienza respiratoria). Rivolgersi al medico o al farmacista se si manifestano effetti collaterali.

Sovradosaggio ed errori di assunzione:

I principi attivi delle tetesept Pirosi acuta neutralizzano gli acidi gastrici in modo esclusivamente fisico.

Come deve fare se ha assunto troppo tetesept Pirosi acuta?

In particolare nei pazienti con disturbi della funzionalità renale o in caso di assunzione di alti dosaggi per un periodo prolungato possono insorgere situazioni di ipermagnesiemia o sindrome calcio-alcali (sindrome latte-alcali). La sindrome latte-alcali è associata a un alto livello di calcio nel sangue (ipercalcemia), a una ridotta funzionalità renale e, in alcuni casi, a pancreatite. Possibili sintomi sono una maggiore urgenza minzionale, cefalea, inappetenza, nausea o vomito, insolita sensazione di stanchezza o debolezza. Qualora si sospettino questi effetti collaterali rivolgersi a un medico. Nei casi gravi avvertire subito delle cure mediche. In caso di sospetta sindrome calcio-alcali o ipermagnesiemia consultare un medico. Nei casi gravi avvertire immediatamente delle cure mediche.

Come deve fare se dimentica di assumere tetesept Pirosi acuta o se ne ha assunte poche?

Continuare l'assunzione come prescritto nella posologia.

Che cosa occorre osservare quando si interrompe il trattamento o si conclude in anticipo?

In questo caso potranno nuovamente comparire i disturbi.

Indicazioni sulla durata e la conservazione del prodotto:

La data di scadenza di questo dispositivo medico è stampata sul cartone e sui blister. Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza di tale data!

Indicazioni per la conservazione:

Conservare in luogo asciutto a temperatura non superiore ai 25°C!

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Nota:

Per motivi legati alla produzione, possono occasionalmente presentarsi macchie nere. Ciò non rappresenta un difetto nella qualità.

CE 0482

MN 180003646 07/25 V06

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Strasse 5
D-23562 Lübeck

CH REP Diapharm Switzerland GmbH
Hochbergerstrasse 70
4057 Basel



Merz Lifecare Switzerland AG
Gewerbestrasse 12
CH-4123 Allschwil
www.tetesept.ch

Stand der Information: Dezember 2022

Mise à jour de l'information: Décembre 2022

Stato delle informazioni: Dicembre 2022