

Hühneraugen- pflaster

Medizinprodukt

**Selbstklebende Wirkstoff-
Punkte mit Salizylsäure und
Pflaster für Schutz und örtliche
Behandlung von Hühneraugen.**

- Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
- Enthält 35–40 % Salizylsäure.
- Nicht länger als 2 Wochen anwenden, falls nicht anders mit einem Arzt besprochen.



Zusammensetzung:

Salizylsäure 35–40 %

Inhalt:

6 Wirkstoff-Punkte,
6 Hydrokolloid Pflaster

Überarbeitung:

Diese Gebrauchsanweisung wurde
zuletzt im Februar 2026 überarbeitet.

Durch das 2-Pflaster-System wird das Hühnerauge wirksam entfernt und die umliegende gesunde Haut geschützt. Die Wirkstoff-Punkte entfernen mit Salizylsäure effektiv und gezielt das Hühnerauge. Die transparenten Hydrokolloidpflaster bieten diskreten, fast unsichtbaren Schutz, polstern und lindern den Schmerz.

Das Hydrokolloidpflaster passt sich ideal an kleine Zehen an und stört nicht im Schuh.

Anwendung:

1 × täglich für maximal 2 Wochen anwenden. Die betroffene Stelle vor dem Auftragen idealerweise mit einem warmen Fussbad reinigen und trocknen. Anschliessend den Wirkstoff-Punkt aufkleben und mit dem Pflaster fixieren. Mindestens einmal täglich ersetzen.

Hinweise:

- Nur zur Anwendung auf Hühneraugen.
- Nur zur äusserlichen Anwendung.
- Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden.
- Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen.

Pansement pour œil- de-perdrix

Dispositif médical

**Points de substance active
auto-adhésifs à base d'acide
salicylique et pansements pour
la protection et le traitement
local de l'œil-de-perdrix.**

Le système à deux pansements élimine efficacement l'œil-de-perdrix et protège la peau saine environnante. Les points de substance active éliminent efficacement et spécifiquement l'œil-de-perdrix avec de l'acide salicylique. Les pansements hydrocolloïdes transparents offrent une protection discrète, presque invisible, en amorçant et en soulageant la douleur.

Les pansements hydrocolloïdes s'adaptent idéalement aux petits orteils et ne sont pas gênants dans la chaussure.

Utilisation:

Utiliser 1 fois par jour pendant un maximum de 2 semaines. Nettoyer et sécher la zone affectée avant l'application, idéalement en prenant un bain de pieds chaud. Ensuite, coller le point de substance active et le fixer avec le pansement. Changer au moins une fois par jour.

Remarques:

- A utiliser uniquement sur un œil-de-perdrix.
- Utilisation externe uniquement.
- Ne pas utiliser sur une peau blessée ou qui présente des rougeurs.

- Arrêter tout de suite en cas d'irritations cutanées.
- Les diabétiques, les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 16 ans doivent consulter un médecin avant utilisation.
- Contient 35–40 % d'acide salicylique.
- Ne pas utiliser pendant plus de 2 semaines, sauf avis contraire d'un médecin.



Composition:

Acide salicylique 35–40 %

Contenu:

6 points de substance active,
6 pansements hydrocolloïdes

Révision:

Ce mode d'emploi a été révisé pour la dernière fois en Février 2026.

Cerotti per calli

Dispositivo medico

Punti adesivi con sostanze attive e acido salicilico, cerotti protettivi per il trattamento locale dei calli.

Grazie al sistema costituito da 2 cerotti, il callo viene rimosso in maniera efficace e la pelle sana circostante resta protetta. I punti con sostanze attive e acido salicilico rimuovono il callo in maniera efficace e mirata. I cerotti idrocolloidali trasparenti offrono una protezione discreta, quasi invisibile, attutiscono la pressione e alleviano il dolore.

Il cerotto idrocolloidale si adatta in modo ideale alle piccole dita del piede senza provocare fastidi all'interno della scarpa.

Utilizzo:

Applicare 1 cerotto al giorno per un massimo di 2 settimane. Prima dell'applicazione la zona interessata andrebbe lavata con un pediluvio caldo e asciugata bene. Dopodiché, applicare il punto con sostanze attive e fissarlo con il cerotto. Sostituire almeno una volta al giorno.

Avvertenze:

- Applicare solo sui calli.
- Solo per uso esterno.
- Non applicare sulle ferite o sulla pelle arrossata.
- In caso di irritazione cutanea interrompere immediatamente l'utilizzo.
- In caso di diabete, problemi circolatori, gravidanza, allattamento e bambini di età inferiore ai 16 anni è opportuno chiedere un consulto medico prima dell'utilizzo.
- Contiene il 35–40 % di acido salicilico.
- Non utilizzare per più di 2 settimane se non diversamente indicato dal medico.



Composizione:

Acido salicilico 37 %

Contenuto:

6 punti di sostanze attive,
6 cerotti idrocolloidali

Revisione:

Le presenti istruzioni d'uso sono state rielaborate l'ultima volta nel mese di Febbraio 2026.